

- א. בגרות לבני ספר על-יסודים
ב. בגרות לנבחנים אקסטרניים
הנורף השס"ת, 2008
מספר דוח: 302, 033002
דף נושא: ל-3 ייחדות לימוד
שם הבחן: שאלון ב

מבחן מודולרי

שאלוני ב'

היראות לדוגמה

א. משה היראה: שעיה וחצין

ב. מבנה השאלה ומפתח הטעכה: בשאלון זה יש שאלות לכל שאלה – 25 נקודות. מוגר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא עלתה על 100.

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

- (1) מחשבון לא גրפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הניתן לתכונות. שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
- (2) דפי נוסחה (מצורפים).

ד. היראות מיוחדות:

- (1) אל תעתקיק את השאלה; סמן את מספירה בלבד.
- (2) חתחל כל שאלה בעמוד חדש. רשאי במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר ההישובים מהבאים בעורთ מחשבון. הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ו邏輯ית. חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
- (3) לטיטו יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלה מהמשגיחים. שימוש בטיטו אחרה עלול לגרום לפסילת הבחינה.

התכווית בשאלון זה מנושאות בלשון זכר ומפוזנות לנטהנות ולנבחנים כאחד.

ב. הצלחת!


ה שאלות

בשאלון זה שיש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב-25 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקית, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתזוכל לציבור לא עליה על 100.

שים לב! הסביר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ומצורה ברורה.

חומר פירוט עולול/agdом לפגעה בזכין או לפסילת הבחינה.

אלגברה



1. בציור שלפניך מסודרים הגрафים של הפונקציות:

$$f(x) = (x - 4)^2$$

$$g(x) = x + 2$$

א. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך בין שני הגрафים.

ב. עבור אילו ערכי x מתקיים $f(x) < g(x)$?

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 2 \end{cases}$$

2. סדרה מוגדרת לכל n טבעי על-ידי הכל הנסיגה:

א. מצא את a_2 , a_3 ו- a_4 .

ב. אם $a_{15} = 272$, מצא את a_{16} .

עוד עובדים מעוניין להזמין ממפעל מזון חבילות שי, המכילות רק שקיות צייפס וחפיסות

שוקולד.

הוועוד החליט כי כל חבילה תכיל לכל היוטר 20 פריטים,

משקליה יהיה לפחות 3000 גרם, ונפחיה יהיה לפחות 4800 סמ"ק.

המשקל, הנפח והמחיר של שקיות צייפס ושל חפיסות שוקולד רשומים בטבלה שפניך:

משקל	נפח	מחיר	
2 שקלים	600 סמ"ק	100 גרם	סקיות צייפס
3 שקלים	150 סמ"ק	300 גרם	חפיסות שוקולד

נסמן ב- x את מספר שקיות הצייפס וב- y את מספר חפיסות השוקולד.

א. רשום את מערכת האילוצים של הבעיה.

התחומים האפשריים של הבעיה הוא תחום סגור, שקדקודיו הם: $(4, 16)$ $(6, 8)$ $(15, 5)$.

ב. כמה שקיות צייפס וכמה חפיסות שוקולד צריך להכניס לכל חבילה שי כדי שמחירו יהיה מינימלי, במקרה שהוועוד קובע את הרכיב החבילות?

ג. כמה שקיות צייפס וכמה חפיסות שוקולד צריך להכניס לכל חבילה שי כדי שמחירו יהיה מקסימלי, במקרה שהמפעל קובע את הרכיב החבילות?

טריגונומטריה

A B C D הוא טרפז ישר זווית (ראה ציור). 4


נתון: $AD = 10 \text{ ס"מ}$

$AB = 7 \text{ ס"מ}$

$$\angle DCB = 36^\circ$$

חשב את שטח הטרפז.

/המשך בעמוד 4/



5. הבסיס של מנגרה משולשת ישרה $ABC A' B' C'$

הוא משולש שווה-שוקיים (ראה ציור).

$$\text{נתון: } 9 \text{ ס"מ} = AC = AB$$


$$8 \text{ ס"מ} = CC'$$

$$11 \text{ ס"מ} = BC'$$

א. חשב את אורך המקצוע BC .

ב. חשב את זוויות הראש של בסיס המנגרה.

ג. חשב את נפח המנגרה.



סטטיסטיקה

6. מדדו את המשקל של 6 אנשים. במקומות לרשום את המשקל של כל אחד מהם, רשמו את

בכמה סוטה המשקל של כל אחד מהמשקל הממוצע של ששת האנשים (כלומר רשמו את ההפרש בין המשקל של כל אחד ובין המשקל הממוצע, $\bar{x} - x$).

אחד ההפרשים נמחק بطעות, וחמשת ההפרשים האחרים היו: 7 , -5 , -4 , 1 , 3 .

א. חשב את ההפרש החסר. פרט את חישובך.

ב. חשב את סטיית התקן.

בהתאם!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך