

סוג הבחינה: א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים  
ב. בגרות לנבחנים אקסטרניטים  
מועד הבחינה: קיץ תשע"ד, מועד ב  
מספר השאלה: 312, 035802  
דף נסחאות ל-3 ייחדות לימוד  
נספח:

## מתמטיקה

### 3 ייחדות לימוד — שאלון שני

#### הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שעה וחצי.

ב. מבנה השאלה ופתח הערכה: בשאלון זה שיש שאלות.

כל שאלה – 25 נקודות.

מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,

אך סך הנקודות שתוכל לצבר לא עלתה על 100.

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

(1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הניתן לתכנות.

שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.

(2) דפי נסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

(1) כתוב את כל היחסים והתשובות בגוף השאלה.

אסור לכתוב על הפסים שבשוליים.

(2) לטiotה יש להשתמש בדףים שבגוף השאלה (כולל הדפים שבסוף) או בדףים

שקיים מהמשגיחים. שימוש בטiotה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

(3) הסביר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירות ובצורה ברורה ומסודרת.

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

הערה: קישורית לדוגמאות תשובה לשאלון זה תתפרסם בדף הראשי של אתר משרד החינוך.

התנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים כאחד.

**ב ה צ ל ח ה !**


/המשך מעבר לדף/

## השאלות

בשאלון זה שיש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב-25 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 100.  
בתוב את כל החישובים והතשובות **בגוף השאלון**.


**שים לב!** הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירות ובצורה ברורה.  
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בזכיון או לפסילת הבדיקה.

### אלgebra




1. בציור שלפניך מתואר גרף הפרבולה  $y = x^2 + 2x - 3$ .  
הפרבולה חותכת את הצירים בנקודות A, B ו-C.
    - א. מצא את שיעורי הנקודות A, B ו-C.
    - ב. הראה על ידי חישוב כי הנקודות A ו-B נמצאות גם על הישר שמשוואתו  $3 - x = y$ .
    - ג. עבור הנקודה על הפרבולה ששיעור ה- $x$  שלו הוא  $-2$ .
- קבע אם היא נמצאת מעל לישר AB או מתחתיו. נמק.

--



/המשך בעמוד 4/



.2. מפעל, המיצר חלקו של פולימר למכוניות, ייצור בחודש הראשון 1,500 פריטים.


בגלל דרישות השוק הגביר המפעל את הייצור, וייצור בכל חודש לאחר מכן 200 פריטים יותר מבחודש ש לפניו.



א. כמה פריטים ייצור המפעל בחודש ה- 6 ?

ב. כמה פריטים סך הכל ייצור המפעל ב- 12 החודשים הראשונים?

ג. הרווח הנקי של המפעל ממכירת כל פריט הוא 10 ש"ח.

כמה הרווחה המפעלי מון הפריטים שייצור ב- 12 החודשים הראשונים?





3. דורון ליה הלוואה מן הבנק בסך 300,000 שקלים.

בכל שנה הוא הקטין את חובו לבנק ב- 12% .


א. מה היה החוב של דורון לבנק לאחר שנתיים לאחר שלקח את ההלוואה?

ב. (1) מה היה החוב של דורון לבנק 12 שנים לאחר שלקח את ההלוואה?

(2) 12 שנים לאחר שלקח את ההלוואה, קיבל דורון 65,000 שקלים מקרן השתלמות.

האם סכום זה יספיק לדורון כדי להחזיר את יתרת החוב שלו לבנק? נמק.

בתשובותיך דיקק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.




טריגונומטריה



4. במשולש שווה-שוקיים  $ABC$  ( $AB = AC$ )

זווית הבסיס  $69^\circ$ .

אורך הגובה AD לבסיס BC הוא 12 ס"מ.


- ב. חשב את האורך BE, הגובה לשוק AC.  
א. חשב את אורך הבסיס BC.








הסתברות וסטטיסטיקה



- לפניך רשימה של חמישה ציונים: 76, 77, 78, 83, 86.
- א. חשב את ממוצע הציונים ואת סטיית התקן.
- ב. (1) הוסף ציון שישי כך שהממוצע של ששת הציונים לא ישתנה.  
(2) האם לאחר הוספת הציון השישי סטיית התקן גדלה, קטנה או לא השתנה?  
نمך.





6. במחסן יש שני מתקני התרעה נגד שרפה.  
ההסתברות שהמתקן הראשון יפעל במקרה של שרפה היא 0.9.  
ההסתברות שהמתקן השני יפעל במקרה של שרפה היא 0.8.
- א. מהי ההסתברות שבמקרה של שרפה יפעל המתקן הראשון והמתקן השני לא יפעלו?  
ב. מהי ההסתברות שרק אחד מן המתקנים יפעל במקרה של שרפה?  
ג. מהי ההסתברות שלפחות מתקן אחד יפעל במקרה של שרפה?





### בהתכלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

/בחמישן דפי מחברת נוספת/