

<b>סוג הבדיקה:</b> א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים ב. בגרות לנבחנים אקסטרניים <b>מועד הבדיקה:</b> קיץ תשע"א, 2011 <b>מספר השאלה:</b> 653, 917531 <b>נושאות ונתונים בפיזיקה ל-5 יח"ל</b>	<b>מדינת ישראל</b> <b>משרד החינוך</b>
---	--

## פיזיקת

### מבחן

لتלמידי 5 ייחוזת לימוד

#### הויראות לנבחן

- א. **משך הבדיקה:** שעה ושלושה רביעים (105 דקות).
- ב. **מבנה השאלה ופתחה הערוכה:**  
בשאלון זה חמיש שאלות, ומהן עלייך לענות על שלוש שאלות בלבד.  
כל שאלה –  $\frac{1}{3}$  נקודות;  $3 \times \frac{1}{3} = 33$  נקודות
- ג. **חומר עזר מותר בשימוש:** (1) מחשבון.  
(2) נספח נושאות ונתונים בפיזיקה המצורף לשאלון.
- ד. **הוראות מיוחדות:**
- (1) ענה על מספר שאלות כפי שהתקשת. תשובות לשאלות נוספות נספות לא ייבדקו (התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבדיקה).
  - (2) בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשאי רשם את הנוסחאות שאתה משתמש בהן. כאשר אתה משתמש בסימן שאינו בדף הנוסחאות, כתוב במילים את פירוש הסימן. לפני שאתה מבצע פעולות חישוב, הציב את הערכות המתאימים בנוסחאות. רשאי את התוצאה שקיבלת ביחסות המתאים. אידרושים הנוסחה או אי-יביצוע ההצבה או אידרושים ייחודיים עלולים להפחית נקודות מהציון.
  - (3) כאשר אתה נדרש לחשב גודל באמצעות נתוני השאלה, רשאי ביתוי מתמטי הכלול את נתוני השאלה או את חלוקם; במידת הצורך אפשר להשתמש גם בקבועים בסיסיים, כגון תואצות הנפילה החופשית g או קבוע הכבידה העולמי G.
  - (4) בחישובך השתמש בערך  $2/m^2 = 10$  לתואצת הנפילה החופשית.
  - (5) כתוב את תשובה תicked בעט. כתיבה בעיפרון או מחקה בטיפקס לא יאפשר ערעור. מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.

כתב **במחברת הבדיקה בלבד**, עםזהים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב **בטויפח** (ראשי פרקים, חישובים וכדומה). רשום "טיווח" בראש כל עמוד טווחה. וישום טווחות כלשון על דפים שמקורם למחברת הבדיקה עלול לגרום לפסילת הבדיקה!

ההנחיות בשאלון זה מנוטחות בלשון זכר וanedwonot לנבחנות ולגנטיגיט פארהץ.

**בהתאם!**


/המשך מעבר לדף/

### ה ש א ל ו ת

ענה על שלוש מהשאלות 1-5.

(לכל שאלה —  $\frac{1}{3}$  נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשאי בסופו).

1. רן מבצע במעבדה ניסוי לחקרת תנועת עגלה על מישור משופע. לצורך זה הוא משתמש במכשיר המכונה "רשם זמן", המסתמן על סרט נייר נקודת בכל  $s = 0.02$ . בניסויו שון מבצע סרט הנייר מחובר לעגלה המשוחררת ממנוחה (ראה תרשימים A).



תרשימים A

בתרשימים B מוצג חלק מהסרט שהתקבל בניסוי.



תרשימים B

A. על סמך תרשימים B, קבע אם תנועת העגלה היא תנועה קצובה או תנועה מואצת. نمך.

(6 נקודות)

B. חשב את המהירות הממוצעת של העגלה בקטע MN. (8 נקודות)


(שיעור לב: המשך השאלה בעמוד הבא).

/המשך בעמוד 3/

- א. חשב את מהירות הרגעת של העגלה בנקודה A. פרט את המשכובב. (8 נקודות)
- ב. חשב את תאוצת העגלה, בהנחה שהיא קבועה. (6 נקודות)
- ג. חשב את המרחק בין הנקודה N לבין הנקודה P הבאה אחרת.  
(הנקודה P אינה מופיעה בתרשימים). (5  $\frac{1}{3}$  נקודות)

/המשך בעמוד 4/

- תלמידים ערכו ניסוי למדידות מקדם החיכוך הסטטי  $\mu$  בין שני משטחים. בניסוי התלמידים משתמשים ב קופסה ריקה שהמסה שלה  $M$ , המונחת על שולחן אופקי, בקפיץ שבווע הקפיץ שלו  $k$ ; בסרט מדייה ובגלאים שהמסה של כל אחד מהם היא  $m$ . תלמיד מ לחבר את הקפיץ לאחת מפאות הקופסה ומורשך אותו, כמתואר בתרשימים א. ה קופסה נשארת במנוחה.




תרשים א

- א. סרטט תרשימים של כל הכוחות הפועלים על הקופסה הירקבה במצב המתוור, ורושם ליד כל חץ את שם הכוח.  $(\frac{1}{3}$  נקודות) התלמיד מכניס גליל אחד לתוך הקופסה, ומותח את הקפיץ. ברגע שה קופסה נמצאת על סף תנועה, הוא מודד את התארכויות הקפיץ  $\ell$ . התלמיד מוסיף גליים לתוך הקופסה, ובכל פעם מודד את התארכויות הקפיץ ברגע שה קופסה על סף תנועה. תוצאות הניסוי מוצגות בגרף שבתרשים ב (בעמוד הבא).

(שים לב: תרשיש ב והמשך השאלה בעמוד הבא.)

/המשך בעמוד 5/



תרשים ב

- ב. חשב את שיפוע הגראף, וציין את משמעותו הפיזיקלית. (6 נקודות)  
 ג. הוכח כי הקשר בין  $\Delta \ell$  (התארכויות הקפיצ) לבין n (מספר הגלילים) נתון על ידי הביטוי:

$$\Delta \ell = \frac{\mu mg}{k} \cdot n + \frac{\mu Mg}{k}$$


(6 נקודות)

$$k = 12 \frac{N}{m}$$

הmassה של כל אחד מהגלילים היא 80gr.

- ד. מצא את מקדם החיכוך הסטטי בין הקופסה לבין המשטח. (7 נקודות)  
 ה. היעזר בגרף ומצא את המסה של הקופסה הריקת. (5 נקודות)  
 ו. חשב את הגודל של כוח החיכוך הפועל על הקופסה הריקה, כאשר m = 0.02m.  $\Delta \ell = 0.02m$  (5 נקודות)

3. בתרשים A שלפניך מוצגת מסילה חלקה, ועליה שלושה גופים A, B ו- C היכולים לנוע על המסילה ללא חיכוך. בקצה המסילה יש קיר.



תרשים A

ה גופים A ו- B מחוברים זה לזה באמצעות קפיץ דרוך שמסתו זניחה.

$$\text{נתון: } m_A = 0.1 \text{ kg}$$

$$m_B = 0.2 \text{ kg}$$

A. משחררים את הקפיצ', וה גופים A ו- B מתחלים לנוע.

(1) מהו תנועת המערכת של שני הגופים A ו- B מיד לאחר שחרור הקפיצ'?

הסביר.

(2) מיד לאחר שחרור הקפיצ', גוף A נעה בכיוון הקיר במהירות שגודלה  $v_A = 0.6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

חשב את המהירות של גוף B (גודל וכיוון) מיד לאחר שחרור הקפיצ'.

$$(7 \text{ נקודות})$$

B. גוף A מתנגש אלסטית בקיר שבקצה המסילה.


(1) מצא את המהירות של גוף A (גודל וכיוון) מיד לאחר ההתנגשות בקיר. הסביר.

(2) חשב את גודל המתך שפעיל הקיר על גוף A, וציין את כיונו.

$$(8 \text{ נקודות})$$

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)

ג. הגרף שלפניך מתאר את גודל הכוח שפעיל הקיר על גוף A, כפונקציה של זמן.



- (1) מה מייצג השטח הכלוא בין הגרף לבין ציר הזמן?
  - (2) חשב בעזרת הגרף את הגודל המרבי של הכוח שהפעיל הקיר על גוף A במהלך ההתנגשות בקיר.
- (8 נקודות)

ג. גוף B, שאט מהירותו חישבת בתת-סעיף א (2), מתרחש בגוף C שמסתו  $m_C = 0.4\text{kg}$ , מתרחש בגוף C שמסתו  $m_C = 0.4\text{kg}$ , הנע לכיוונו. שני הגוף נצמדים זה אל זה.


- (1) נתון שהאנרגיה הקינטית של שני הגוף יחו אחריה ההתנגשות היא אפס. חשב את המהירות של גוף C לפני ההתנגשות.
- (2) אם גודל המהירות של גוף C לפני ההתנגשות יהיה קטן מגודל המהירות שחישבת בתת-סעיף ד (1), לאיזה כיוון ינוע הגוף הצמודים B ו- C?

קבע בלי חישוב.

(10 נקודות)

/המשך בעמוד 8/

4. תלמידה מבצעת ניסוי ובו גוף שמסתו  $M$  נע לאורך מסילה  $ABCD$ . המסילה מורכבת משלושה קטועים: קטע משופע  $AB$ , קטע אופקי  $BC$  וקטע עקום  $CD$ . הקטעים  $AB$  ו- $CD$  חלקים, בקטע  $BC$  יש חיכוך.



הגוף משוחרר ממנוחה מנקודה  $A$ , הנמצאת בגובה  $H_A$  מעל הקרקע (ראה תרשים). התלמידה משנה את הגובה  $H_A$  של הנקודה  $A$  מעל הקרקע, ומחשבת בכל פעם את גודל מהירות הגוף בנקודה  $D$ .

א. (1) הסבר מדוע שינוי הגובה  $H_A$  משפיע על גודל המהירות  $v_D$ .

(2) משחררים את הגוף מגובה  $H_A$  השווה לגובה של נקודה  $D$  מעל הקרקע.

קבע אם הגוף יגיע לנקודה  $D$ . נמק את קביעתך

( $\frac{1}{3}$  נקודות)

(שים לב: המשך השאלה בעמוד הבא.)

/המשך בעמוד 9/

בטבלה שלפניך מוצגות תוצאות הניסוי של התלמיד.

$H_A$ (m)	$v_D^2$ ( $\frac{m}{s}$ )	$v_D^2$ ( $\frac{m^2}{s^2}$ )
1.2	3.75	
0.9	2.80	
0.8	2.50	
0.7	2.00	
0.6	1.45	

ב. (1) העתק את הטבלה למחברתך, חשב את ערכי ריבוע המהירות  $v_D^2$  והוסף אותם בשורה השלישית.

(2) סרטט גраф של  $v_D^2$  כפונקציה של  $H_A$ .

(10 נקודות)

בתשובהתיק לסעיפים ג-ד היעזר בגרף שטרטוט בסעיף ב (2).

ג. מצא את הגובה המינימלי שמננו יש לשחרר את הגוף כדי שיגיע לנקודה D.  
הסביר את שיקוליך. (7 נקודות)

ד. כאשר שחררו את הגוף מגובה  $H_A = 1.1$  הוא הגיע לנקודה D שגובהה מעל הקרקע הוא  $0.3\text{ m}$ . חשב את העבודה כוח החיכוך שפועל על הגוף בתנועתו במסילה אם נתון שמסת הגוף היא  $M = 0.2\text{ kg}$ . (8 נקודות)

- עמוס 1 הוא לוויין התקשורות הישראלי הראשון, שפיתחה התעשייה האוירית של ישראל. המסלול של הלוויין עמוס 1 הוא מעגלי (בקירוב). כלוויין תקשורת עמוס 1 נמצא כל הזמן מעל אוטה נקודה A שלל פנִי כדור הארץ.
- א. קבע את זמן המחוור של הלוויין עמוס 1. نمך את קביעתך. (4 נקודות)
- ב. חשב את גובה המסלול של הלוויין עמוס 1 על פנִי כדור הארץ. (8 נקודות)
- ג. חשב את גודל התואצה של הלוויין עמוס 1 במסלולו. (8 נקודות)
- ד. לוויין אחר (לא לוויין תקשורת) מקיים את כדור הארץ במסלול מעגלי במשך 12 שעות. השתמש במוקי כפלר וחשב באיזה גובה מעל פנִי כדור הארץ עבר המסלול של לוויין זה. (8 נקודות)
- ה. קבע באיזה מההיגזים 1-3 שלפניך אינו נכון, והסביר מדוע הוא אכן נכון.  
(1) תנועת לוויין במסלולו היא נפילת חופשית.  
(2) גודל המהירות הקווית של נקודה A שלל פנִי כדור הארץ שווה לגודל המהירות הקווית של הלוויין עמוס 1 הנע במסלולו.  
(3) גודל המהירות האוזויטית של נקודה A שלל פנִי כדור הארץ שווה לגודל המהירות האוזויטית של הלוויין עמוס 1 הנע במסלולו.
- (5 נקודות)

פ. הצלחת!

זכות היוצרים שומרה למדינת ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך